

***Spezifisch konzipiert, gewährleistet Gengigel eine einfache, schnelle und effektive Anwendung.
Ideal für die Applikation auf Wunden und während der postoperativen Phase.***

Die Hyaluronsäure ist physiologisch der bedeutendste Proteoglykan, den wir in der extrazellulären Matrix der Schleimhaut finden, wo er zusammen mit anderen Bestandteilen des Bindegewebes die Festigkeit und Elastizität sicherstellt, was wesentlich für eine gute orale Gesundheit ist.

Hyaluronsäure besitzt eine Reihe heilsamer Eigenschaften, die ein erfolgreiches Programm dentaler Behandlung und die orale Gesundheit unterstützen.

Insbesondere wichtig ist, dass Hyaluronsäure das 50-fache ihres Trockengewichts an Wasser absorbieren kann.

Diese Eigenschaft ermöglicht der Hyaluronsäure als Barriere gegen eine Penetration von Mikroorganismen und anderen Toxinen zu wirken, die zur Ätiologie der Periodontalerkrankung beisteuern können.

Gengigel® **First-aid**

- enthält eine Quelle an Hyaluronsäure nicht tierischer Herkunft, gewonnen durch einen biotechnologischen Prozess, mit einer hohen Qualität und Reinheit, in Form von Natriumsalz mit hoher Molekülmasse,
- hat eine langanhaltende lokale Wirkung,
- durch die spezielle Formulierung des Produktes klebt es an der Schleimhautmembran.
- kann ohne Vorbehalt bei allen Patienten, einschließlich Kindern, Schwangeren, älteren Personen und Diabetikern, angewendet werden.

Indikationen

Gengigel® **First-aid**

- Produkt kann auf Wunden bei sekundären Heilungsraten verwendet werden.
- lindert Schmerzen und Unbehagen, besonders nach Traumata, chirurgischen oder periodontalen Eingriffen, Implantatsetzungen, Zahnextraktionen und subgingivaler Glättung der Wurzeln.
- Unterstützt und beschleunigt antiödematöse und antiinflammatorische Prozesse.

Gebrauchsanweisung

Sogleich nach der dentalen Behandlung mit 5 ml Dosierbecher für 1–2 Minuten ausspülen.

Die Behandlung wird 2–4-mal pro Tag, nach richtiger oraler Hygiene, fortgesetzt, wenn nicht anders vom Arzt empfohlen.

Die Lösung ist gebrauchsfertig; nicht verdünnen.

Verpackung

Gengigel® **First-aid**, 50 ml, Flasche mit Dosierbecher.

Warnungen

Bestätigte individuelle Empfindlichkeit gegen Bestandteile.

Lagerung bei einer Temperatur von 5°C – 40°C.