

Zutaten pro 100 g Pulver:  
PMA-Zeolith 100 g.

100857

Füllhöhe technisch bedingt. Der PMA-Zeolith setzt sich bei längerer Standzeit ab.

Nettofüllmenge: **100 g e**

#### Anwendung:

Nehmen Sie 2 – 3 mal täglich je einen gestrichenen Portionslöffel zu den Mahlzeiten aufgerührt in einem Glas (mind. 100 ml) Wasser ein.

Die Einnahmedauer sollte mindestens 12 Wochen betragen bzw. solange die wiederkehrenden physischen Belastungen gegeben sind.

# MED DARM REPAIR

100 % reine Natur



100 g Pulver

## PANACEO

**Zur Behandlung einer eingeschränkten Barrierefunktion der Darmwand (Leaky-Gut). Bindet Schwermetalle\* und Ammonium im Magen-Darm-Trakt** \* Blei, Cadmium, Arsen, Chrom und Nickel

### Natur-Medizinprodukt

PANACEO MED DARM-REPAIR ist ein natürliches Medizinprodukt, das als Kationentauscher im Magen-Darm-Trakt wirkt und selektiv definierte Schadstoffe binden kann. PANACEO MED DARM-REPAIR basiert auf einem Natur-Zeolith-Klinoptilolith, der mittels einem einzigartigen Verfahren, der PMA- Panaceo-Mikro-Aktivierung optimiert wird (PMA-Zeolith). Es ist bekannt, dass unterschiedliche, insbesondere wiederkehrende physische Belastungen zu einer Störung der Darmwandintegrität (Leaky-Gut) führen können. Durch die erhöhte Permeabilität gelangen vermehrt Fremdstoffe und Endotoxine aus dem Darm in den Blutkreislauf. Mögliche Symptome im Zusammenhang mit „Leaky-Gut“ sind Beschwerden im Intestinaltrakt. Wir empfehlen die Beratung durch Ihren Arzt oder Apotheker bei allen Indikationen, die in Zusammenhang mit einer erhöhten Permeabilität stehen.  
(Weitere Informationen und Sicherheitshinweise siehe Innenseite.)

PZN – 5228512



**HERGESTELLT IN ÖSTERREICH**

PANACEO International GmbH  
Finkensteiner Straße 5  
A-9585 Gödersdorf, Villach, Austria

[www.panaceo.com](http://www.panaceo.com)

Chargennummer & Ablaufdatum siehe Dosenboden



Hier öffnen ►

Wissenschaftlich nachgewiesen ist, dass der PMA-Zeolith in der Lage ist, die Darmwandintegrität signifikant positiv zu beeinflussen - messbar über eine verringerte Konzentration des „tight junction modulators“ Zonulin.

## Sicherheitshinweise

Außer gelegentlich auftretender Obstipation (Verstopfung) sind keine Nebenwirkungen bekannt.

Beenden Sie die Einnahme, wenn Sie einen unerwarteten Effekt bemerken. Da PANACEO MED DARM-REPAIR als Nebeneffekt die körpereigene Immunaktivität erhöhen kann, informieren Sie bei gleichzeitiger Einnahme von Medikamenten Ihren Arzt.

Beachten Sie die relativen Kontraindikationen bevor Sie PANACEO MED DARM-REPAIR einnehmen.

Relative Kontraindikationen (nur nach Rücksprache mit einem Arzt):  
Bei Verabreichung von Anti-Rheumatica, während Chemo- und Radiotherapie, bei vorliegender Obstipation, bei vorliegenden Krankheiten oder medikamentöser Therapie. Die Anwendung an Kindern und Jugendlichen, sowie an schwangeren und stillenden Frauen.

Wir empfehlen eine um 2 Stunden zeitversetzte Einnahme von PANACEO MED DARM-REPAIR mit Medikamenten, wobei Medikamente, falls nicht anders verordnet, vor PANACEO MED DARM-REPAIR eingenommen werden sollten.

Überschreiten Sie nicht die angegebene Tagesdosis ohne Absprache mit Ihrem Arzt. Nicht inhalieren. Außer Reichweite von Kindern unter 6 Jahren aufbewahren. Die Dose nach der Verwendung immer schließen.



Ständige Kontrollen garantieren die hohe Qualität und Wirksamkeit als Medizinprodukt gemäß der europäischen Richtlinie 93 / 42 / EWG.